


DODATNI POSTOPKI OŽIVLJANJA OTROK

VARNOST? - ZAKLIČI 'NA POMOČ'



MED KPO

- Zagotovi kakovostne stise prsnega koša: frekvenca, globina, odsun/sprostitev prsnega koša
- Predihavaj z dihalnim balonom in uporabi 100 % kisik (tehnika dveh reševalcev)
- Izogibaj se hiperventilaciji
- Vzpostavi intravensko ali intraosalno pot
- Ponavljalj adrenalin na vsakih 3-5 minut
- Ponovi amjodaron 5 mg/kg (največ 150 mg) po petem el. sunku
- Razmisli o vzpostavitvi umetne dihalne poti z naprednimi pripomočki in uporabi kapnografijo
- Prsni koš stiskaj neprekinjeno, če je dihalna pot vzpostavljena. Frekvenca vpihov: 25/min (dojenčki), 20/min (1-8 let), 15/min (8-12 let), 10/min (>12 let)
- Razmisli o postopnem višanju energije el. sunka (največ 8J/kg oz. 360J) pri refraktarni VF/pVT (≥6 el. sunkov)

PREPOZNAJ IN ZDRAVI POPRAVLJIVE VZROKE

- Hipoksija
- Hipovolemija
- Hipo/hiperkaliemija, -kalcemija, -magnezemija, hipoglikemija
- Hipo/hipertermija
- Toksini
- Tenzijski pnevmotoraks
- Tamponada srca
- Tromboza - srčnih ali pljučnih žil

PRILAGODI ALGORITEM PRI SPECIFIČNIH STANJIH (npr. travma, ECPR)

TAKOJ PO VZPOSTAVITVI ROSC

- uporabi ABCDE pristop
- vzdržuj oksigenacijo SpO₂ 94-98 %) in normalen PaCO₂
- Prepreči hipotenzijo
- Prepoznaj in zdravi vzrok srčnega zastoja